【 診療科：脳神経外科】
【 レジメン登録番号：SN-02 】

〈 Temozolomide療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール（day）																									
			1	2	3	4	5	6	7	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	28
テモダール	150mg/㎡	div	○	○	○	○	○																					

【1コース期間：28日】　　【総コース数：制限なし】

【適応癌種：悪性神経膠腫（再発） 】

【時期： 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

〈day1〉

Rp.1	イメンドカプセル 125mg	p.o.
Rp.2	生理食塩水 100mL	div(ルートキープ用)
Rp.3	デキサート 3.3mg	div（15分で）
	5-HT_3R Blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.4	テモダール 150mg/㎡※1	div（90分で）
	注射用水 1Vあたり41mL	
	生理食塩水 200mL	
Rp.5	生理食塩水 100mL	全開で

〈day2～5〉

Rp.1	イメンドカプセル 80mg	p.o.（day2～3のみ）
Rp.2	生理食塩水 100mL	div(ルートキープ用)
Rp.3	デキサート 3.3mg	div（15分で）
	5-HT_3R Blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.4	テモダール 150mg/㎡※1	div（90分で）
	注射用水 1Vあたり41mL	
	生理食塩水 200mL	
Rp.5	生理食塩水 100mL	全開で

【備考※1 ：2クール目以降、200mg/㎡に増量することが可能。 】

【変法情報： 】