【 診療科：消化器内科】
【 レジメン登録番号：IA-27 】

〈 weekly PTX療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール（day）								・・・・・		・・・・	
			1	2	3	4	5	6	7	8		15		28
パクリタキセル	60～80mg/㎡	div	○							○		○		

【1コース期間： 28日】　　【総コース数：　　コース】

【適応癌種： 胃癌 】

【時期： 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
好中球数	1500未満	20%減量	1500以上
血小板数	7.5万未満	20%減量	7.5万以上
総ビリルビン	1.5以上	休薬	1.5未満
AST・ALT	正常値の2倍	休薬	正常の2倍以下
クレアチニン	2.0以上	休薬	2.0未満

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	div（100mL/h）
Rp.2	ポララミン 1A	div（全開）
	デキサート 6.6mg	
	H_2-blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	パクリタキセル 60～80mg/m	div（90分で）
	5%ブドウ糖液 250mL	

【参考文献：A Phase Ⅱ Study of Weekly Paclitaxel as Second-line Chemotherapy for Advanced Gastric Cancer (CCOG0302 Study)； ANTCANCER RESERCH 27 : 2667-2672 (2007)】

【備考： ポララミンはベナ錠（50mg）内服でも可

【変法情報：