

【 診療科:呼吸器内科 】  
 【 レジメン登録番号:IP-13 】

### 〈 PEM(アリムタ)単剤療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)															
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	15	.....	21				
アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	○															

【1コース期間: 21 日】                      【総コース数: 】

【適応癌種: 悪性胸膜中皮腫・非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)】

【時期: 術前、術後、**手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
WBC	3,000 μL/未満	中止	
Plt	100,000/μL未満	中止	

#### 投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 6.6mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	アリムタ 500mg/m <sup>2</sup>	div(10分で)
	生理食塩水 100mL	

【参考文献:

【備考: 重篤な副作用の発現を軽減するため、葉酸及びビタミンB<sub>12</sub>を投与すること。】

【 ※葉酸: 本剤初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。  
 なお、本剤の投与を中止又は終了する場合には、本剤最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。】

【 ※ビタミンB<sub>12</sub>: 本剤初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB<sub>12</sub>として1回1mgを筋肉内投与する。  
 その後、本剤投与期間中及び投与中止後22日目まで9週毎(3コース毎)に1回投与する。】

【変法情報: