

【 診療科: 婦人科 】

【 レジメン登録番号: GY-18 】

〈 CPT-11単剤療法(B法) 〉

1コース中2回投与の場合

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | |
|--------|----------------------|------|---------------|-------|----|-------|
| | | | 1 | | 15 | |
| イリノテカン | 150mg/m ² | div | ○ | | ○ | |

1コース中3回投与の場合

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | |
|--------|----------------------|------|---------------|-------|----|-------|----|-------|----|
| | | | 1 | | 15 | | 29 | | 49 |
| イリノテカン | 150mg/m ² | div | ○ | | ○ | | ○ | | |

【1コース期間: 日】

【総コース数: コース】

【適応癌種: 卵巣癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|-----|-------------------|------|-------------------|
| Plt | 100,000 μ L未満 | 中止 | 100,000 μ L以上 |

投与プロトコール

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|--------------------------------|---------------------------|
| Rp.1 | 5-HT ₃ R Blocker 1A | div(30分で) |
| | H ₂ Blocker 1A | |
| | 生理食塩水 50mL | |
| Rp.2 | デキサート 16.5mg | div(30分で) |
| | 生理食塩水 50mL | |
| Rp.3 | イリノテカン 150mg/m ² | div(3時間で) |
| | 生理食塩水 500mL | |
| Rp.4 | ソルデム3A 1000mL | div(80mL/h) ^{*1} |

【参考文献:]

【備考: ※1...0時で残破棄し、40mL/hで更新]

【変法情報: イメンド(アプレピタント)使用時は、デキサートの投与量を 8.25mg/回に半減する。]