

【 診療科:血液腫瘍内科】

【 レジメン登録番号:IG-102c 】

< SAL-AIDA2000 Consolidation therapy①(ハイリスク群) >

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)								
			1	2	3	4	5	6	7	
ダウノマイシン	60mg/m ²	div	○	○	○						
キロサイド	200mg/m ²	div	○	○	○	○	○	○	○	○	

【1コース期間: 】

【総コース数:1コース】

【適応癌種:急性前骨髄性白血病】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1-3>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ RB 1A 生理食塩液 50mL	div(全開で)
Rp.2	ダウノマイシン 60mg/m ² 5%Glu 100mL	div(1時間で)
Rp.3	キロサイド 200mg/m ² 生食 500mL	div(24時間で)

<day4-7>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ RB 1A 生理食塩液 50mL	div(全開で)
Rp.2	キロサイド 200mg/m ² 生食 500mL	div(24時間で)

【参考文献:Ann Hematol(2015)94:557-563 】

【備考:本レジメン終了後、CRが維持されている場合はConsolidation②(ハイリスク群)へ移行する。 】

【変法情報:60歳を超える患者では、ダウノマイシンを45mg/m²、キロサイドを100mg/m²に減量して投与する。 】