

【 診療科:泌尿器科】
 【 レジメン登録番号:UR-10 】

〈 VIP療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)																		
			1	2	3	4	5	6	7	21										
イホマイド	1.2g/m ²	div	○	○	○	○	○														
ウロミテキサン	400mg/m ² × 3	div	○	○	○	○	○														
シスプラチン	20mg/m ²	div	○	○	○	○	○														
エトポシド	75mg/m ²	div	○	○	○	○	○														

【1コース期間: 21日】 【総コース数: 3~4 コース】

【適応癌種: 精巣腫瘍】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1~5>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソルデム3A 1000mL	div(40mL/hで)
Rp.2	ソリュージェンF 500mL	div(120分で)
	ソル・コーテフ 100mg	
Rp.3-① (Rp.3-②と同時)	イホマイド 1.2g/m ²	div(60分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3-② (Rp.3-①と同時)	ウロミテキサン 400mg/m ²	div(60分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	マンニトールS 300mL	div(60分で)
Rp.5	5-HT ₃ R Blocker 1A ^{※1}	div(120分で)
	ソリュージェンF 500mL	
Rp.6	ウロミテキサン 400mg/m ²	div(60分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.7	シスプラチン 20mg/m ²	div(120分で)
	生理食塩水 500mL ^{※2}	
Rp.8	ソリュージェンF 500mL	div(60分で)
	ラシックス注 20mg	
Rp.9	マンニトールS 300mL	div(60分で)
Rp.10	ウロミテキサン 400mg/m ²	div(60分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.11	エトポシド 75mg/m ²	div(120分で)
	5%ブドウ糖液 500mL	
Rp.12	ソリュージェンF 500mL	div(120分で)

※2下記備考欄参照

【参考文献: Cisplatin and Ifosfamide with Either Vinblastine or Etoposide as Salvage Therapy for Refractory or Relapsing Germ Cell Tumor Patients(Fadi Farhat,M.D.et al;American Cancer Society 1193-1197,1996)】

【備考①: ※1…アロキシを使用した場合は、原則 5HT₃RB のday2~5の投与は行わない。】

【備考②: ※2…Rp.6の生理食塩水は、シスプラチンの投与量が多い場合、その注入量と合わせて500mLとする。】

【変法情報:】