

【 診療科:口腔外科 】
 【 レジメン登録番号:OS-05 】

〈アービタックス+PF(シスプラチン+5-FU)併用療法〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|-------|----|---|--|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 15 | | 21 | | | | |
| アービタックス | 400mg/m ² (2回目~250mg/m ²) | div | ○ | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | |
| シスプラチン | 100mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル | 1000mg/m ² | div | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: アービタックスは、PDまで。PFは、PDまで最長6コース】

【適応癌種: 頭頸部癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|------------|----|------|----------|
| 詳細は別紙資料参照。 | | | |

投与プロトコール

〈第1日目〉

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|--------|---|-----------------------------|
| Rp.1 | 生理食塩水 1000mL | div(4時間で) |
| Rp.2-1 | ソルデム3A 1000mL | div(24時間持続) |
| | フルオロウラシル 1000mg/m ² | |
| Rp.2-2 | デキサート 9.9mg ^{※1} | 側管div(30分で) |
| | H ₂ Blocker 1A | |
| | ポララミン 5mg | |
| | 5-HT ₃ RB 1A | |
| | 生理食塩水 100mL | |
| Rp.3 | アービタックス 400mg/m ² (2回目~250mg/m ²) | 側管div(2時間で) (※2回目から1時間で) |
| | 生理食塩水 250mL | |
| Rp.4 | 生理食塩水 100mL | 側管div(30分で) |
| Rp.5 | シスプラチン 100mg/m ² | 側管div(2時間で) |
| | 生理食塩水 500mL ^{※2} | |
| Rp.6 | マンニトールS 300mL | 側管div(30分で) |
| Rp.7 | ラシックス注 20mg | one shot iv |
| Rp.8 | 生理食塩水 500mL | 側管div(6時間で) |

〈第2~4日目〉

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|--------------------------------|-------------|
| Rp.1 | ソルデム3A 1000mL | div(24時間持続) |
| | フルオロウラシル 1000mg/m ² | |
| Rp.2 | デキサート 6.6mg ^{※1} | 側管div(30分で) |
| | 生理食塩水 100mL | |

〈第8・15日目〉

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|------------------------------|-----------|
| Rp.1 | デキサート 6.6mg | div(30分で) |
| | ポララミン 5mg | |
| | 生理食塩水 100mL | |
| Rp.2 | アービタックス 250mg/m ² | div(1時間で) |
| | 生理食塩水 250mL | |
| Rp.3 | 生理食塩水 100mL | div(30分で) |

【参考文献:Platinum-Based Chemotherapy plus Cetuximab in Head and Neck Cancer N Engl J Med 2008;359:1116-27.】

【備考:※2...生理食塩水の量はプリプラチンと合わせて500mLとなるようにする。】

【変法情報:】