

【 診療科:消化器外科 】  
 【 レジメン登録番号:SG-43 】

## 〈 IRIS + ベバシズマブBS療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	7	.....	14	15	.....	28			
ベバシズマブBS	5mg/kg	div	○												○		
イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	div	○												○		
TS-1	80~120mg/body	p.o.	夕														朝

【1コース期間: 28 日】                      【総コース数:    コース】

【適応癌種: 治癒切除不能・進行・再発結腸癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
WBC	3,000未満	中止	3,000以上
Plt	10万未満	中止	10万以上
T-Bil	3以上	中止	3未満

### 投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	YDソリタT3 200mL	div(50mL/h) ルートキープ, 残破棄
Rp.2	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ベバシズマブBS 5mg/kg	div
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	イリノテカン 100mg/m <sup>2</sup>	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

※初回90分、2回目は60分でも可。  
3回目以降は30分でも可。

【参考文献: 中村路夫ら、日本癌治療学会誌 44(2) : 578, 2009】

【備考①: TS-1投与量 BSA<1.25m<sup>2</sup>, 80mg/day; 1.25≤BSA<1.5, 100mg/day; BSA≥1.5, 120mg/day】

【備考②: CPT-11は、認容性を確認するために60mg/m<sup>2</sup>から開始し、漸増することもある。】