

【 診療科:血液腫瘍内科】
 【 レジメン登録番号:IG-23 】

〈 Hyper CVAD療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	21			
エンドキサン	300mg/m ² × 2	div	○	○	○																
アドリアシン	25mg/m ²	div				○	○														
オンコピン	2mg/body	div				○							○								
デキサート	19.8mg × 2	div	○	○	○	○							○	○	○	○					

【1コース期間:21日】 【総コース数:MTX-AraC療法と交互に4コース繰り返す】

【適応癌種:急性リンパ性白血病】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1~3>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 19.8mg	div(1時間かけて)
	5-HT ₃ RB 1A	
	生理食塩液 100mL	
Rp.2	エンドキサン 300mg/m ²	div(3時間かけて)
	生食 500mL	
Rp.3	デキサート 19.8mg	div(1時間かけて)
	生理食塩液 100mL	
Rp.4	エンドキサン 300mg/m ²	div(3時間かけて)
	生食 500mL	

<day4>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 19.8mg	div(1時間かけて)
	5-HT ₃ RB 1A	
	生理食塩液 100mL	
Rp.2	オンコピン 2mg/body	div(全開で)
	生食 50mL	
Rp.3	アドリアシン 25mg/m ²	div(1時間かけて)
	5%Glu 100mL	
Rp.4	デキサート 19.8mg	div(1時間かけて)
	生理食塩液 100mL	

<day5>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ RB 1A	div(全開で)
	生理食塩液 100mL	
Rp.2	アドリアシン 25mg/m ²	div(1時間かけて)
	5%Glu 100mL	

<day11>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 19.8mg	div(1時間かけて)
	5-HT ₃ RB 1A	
	生理食塩液 100mL	
Rp.2	オンコピン 2mg/body	div(全開で)
	生食 50mL	
Rp.3	デキサート 19.8mg	div(1時間かけて)
	生理食塩液 100mL	

<day12~14>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 19.8mg	div(1時間かけて)
	生理食塩液 100mL	
Rp.2	デキサート 19.8mg	div(1時間かけて)
	生理食塩液 100mL	

【参考文献:】

【備考:血球が回復したら、次コースへ進む。】

【変法情報①:オンコピンはフィルデシン(3mg/m²でmax4mg/body)へ変更することがある。】

【変法情報②:アドリアシンはday4とday5をまとめてday4で行うことがある。(この際のアドリアシンは50mg/m²)】

【変法情報③:アドリアシンはテラルピシン(用量は同じ)に変更することがある。】