

【 診療科:血液内科】

【 レジメン登録番号:IG-62 】

〈 LSG 15 療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)																			
			1	.....	8	.....	15	16	17	.....	28											
オンコビン	1mg/m <sup>2</sup> (max2mg/body)	div	○																			
アドリアシン	40mg/m <sup>2</sup>	div	○																			
エンドキサン	350mg/m <sup>2</sup>	div	○																			
アドリアシン	30mg/m <sup>2</sup>	div				○																
サイメリン	60mg/m <sup>2</sup>	div				○																
フィルデシン	2.4mg/m <sup>2</sup>	div								○												
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	div								○	○	○										
カルボプラチン	250mg/m <sup>2</sup>	div								○												
プレドニン	40mg/m <sup>2</sup>	p.o or div	○			○				○	○	○										

【1コース期間: 28日】

【総コース数: コース】

【適応癌種: 成人T細胞性白血病リンパ腫(ATLL)】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

day	Rp	薬剤名	投与経路(速度)
day1	Rp.1	5-HT <sub>3</sub> RB 1A	div(30分で)
		生理食塩水 50mL	
	Rp.2	オンコビン 1mg/m <sup>2</sup> (max2mg/body)	div(全開で)
		生理食塩水 50mL	
	Rp.3	アドリアシン 40mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
		5%ブドウ糖液 100mL	
	Rp.4	エンドキサン 350mg/m <sup>2</sup>	div(3時間で)
		生理食塩水 500mL	
day8	Rp.1	5-HT <sub>3</sub> RB 1A	div(30分で)
		生理食塩水 50mL	
	Rp.2	アドリアシン 30mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
		5%ブドウ糖液 100mL	
	Rp.3	サイメリン 60mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
		生理食塩水 100mL	
day15	Rp.1	5-HT <sub>3</sub> RB 1A	div(30分で)
		生理食塩水 50mL	
	Rp.2	フィルデシン 2.4mg/m <sup>2</sup>	div(全開で)
		生理食塩水 50mL	
	Rp.3	エトポシド 100mg/m <sup>2</sup>	div(2時間で)
		5%ブドウ糖液 250mL	
	Rp.4	カルボプラチン 250mg/m <sup>2</sup>	div(3時間で)
		生理食塩水 500mL	
day16, 17	Rp.1	5-HT <sub>3</sub> RB 1A	div(30分で)
		生理食塩水 50mL	
	Rp.2	エトポシド 100mg/m <sup>2</sup>	div(2時間で)
		5%ブドウ糖液 250mL	

【参考文献】 VCAP-AMP-VECP Compared With Biweekly CHOP for Adult T-Cell Leukemia : Japan Clinical Oncology Group Study JCOG9801 (JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY Volume 25•NUMBER 34•DECEMBER 1 2007) 】

【備考: \_\_\_\_\_】

【変法情報: \_\_\_\_\_】