

【 診療科:乳腺内分泌外科 】

【 レジメン登録番号:SB-44 】

### 〈 GEM+CBDCA+Pembrolizumab療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	15	....	21			
キイトルーダ	200mg/body	div	○														
ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	div	○							○							
カルボプラチン	(AUC:2) × (GFR+25)mg	div	○							○							

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: コース】

【適応癌種: 乳癌(PD-L1陽性・TNBC) ]

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

#### 投与プロトコール

〈第1日目〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	キイトルーダ 200mg/body	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.3	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 6.6mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	ジェムザール 1000mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
	5%ブドウ糖液 100mL	
Rp.5	カルボプラチン (AUC:2) × (GFR+25)mg	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

〈第8日目〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 6.6mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	ジェムザール 1000mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
	5%ブドウ糖液 100mL	
Rp.3	カルボプラチン (AUC:2) × (GFR+25)mg	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

【参考文献:キイトルーダ点滴静注添付文書、Lancet2020;396:1817-28

【備考:

【変法情報: