

【 診療科:婦人科】

【 レジメン登録番号:GY-3 】

## 〈 TC療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	15	.....	21			
パクリタキセル	180mg/m <sup>2</sup>	div	○														
カルボプラチン	AUC:5~6	div	○														

【1コース期間: 21日】

【総コース数: コース】

【適応癌種: 卵巣癌・子宮頸癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
Plt	100,000 $\mu$ L未満	中止	100,000 $\mu$ L以上

### 投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(90分で)
	生理食塩水 200mL	
Rp.2	H <sub>2</sub> Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 16.5mg	
	ポララミン 5mg	
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	パクリタキセル 180mg/m <sup>2</sup>	div(2時間で)
	5%ブドウ糖 250mL	
Rp.4	カルボプラチン AUC:5~6	div(2時間で)
	5%ブドウ糖 250mL	
Rp.5	生理食塩水 500mL	div(80mL/hで)

【参考文献: ]

【変法情報: イメンド(アプレピタント)使用時は、デキサートの投与量を 8.25mg/回に半減する。 ]