

【 診療科:血液内科 】

【 レジメン登録番号:IG-58 】

〈 リツキシマブBS+トリアキシン併用療法(2日法) 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)			
			1	2	.....	28
トリアキシン	90mg/m <sup>2</sup>	div	○	○		
リツキシマブBS	375mg/m <sup>2</sup>	div	○			

【1コース期間:28日】

【総コース数: 4~6 】

【適応癌種:再発又は難治性低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マンテル細胞リンパ腫】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

【第1日目】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT <sub>3</sub> RB	div(全開で)
	生理食塩液 50mL	
Rp.2	トリアキシン 90mg/m <sup>2</sup>	div(1時間かけて)
	注射用水 40mL×本数	
	生理食塩液 200mL	
Rp.3	ポララミン 5mg	iv ワンショット
	ソル・コーテフ100mg	
Rp.4	リツキシマブBS 375mg/m <sup>2</sup> 備考1	div(25~200mL/h 2~3時間かけて)
	Ns500mL	

【第2日目】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT <sub>3</sub> RB	div(全開で)
	生理食塩液 50mL	
Rp.2	トリアキシン 90mg/m <sup>2</sup>	div(1時間かけて)
	注射用水 40mL×本数	
	生理食塩液 200mL	

【参考文献: Phase II Multicenter Study of Bendamustine Plus Rituximab in Patients With Relapsed 】

【 Indolent B-Cell and Mantle Cell Non-hodgkin's Lymphoma 】

【備考1:生食の量を調節し、概ね10倍希釈となるようにする。】

【変法情報: 】