

【 診療科:婦人科】

【 レジメン登録番号:GY-7 】

〈 GEM + DOCE療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)																
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	21					
ジェムザール	800mg/m ²	div	○											○					
ドセタキセル	70mg/m ²	div	○																

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: 3 コース】

【適応癌種: 卵巣癌、子宮肉腫、子宮頸癌等再発】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
Plt	100,000 μL未満	中止	100,000 μL以上

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 9.9mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	ジェムザール 800mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩水 200mL	
Rp.3	ドセタキセル 70mg/m ²	div(60分で)
	生理食塩水 200mL	

<day8>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 6.6mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	ジェムザール 800mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩水 200mL	

【参考文献:

】

【備考: 3回繰り返し、効果判定を行う

】