

【 診療科:血液腫瘍内科 】  
 【 レジメン登録番号:IG-84 】

### 〈 Kd療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)												
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	28	
カイプロリス	56mg/m <sup>2</sup> (1コース目のday1,2のみ20mg/m <sup>2</sup> )	div	○	○		○	○		○	○					
レナデックス	20mg/body	p.o.	○	○		○	○		○	○			○	○	

【1コース期間: 28日】

【総コース数:制限無し】

【適応癌種:多発性骨髄腫】

【時期: 術前、術後 **手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
薬剤投与基準量			

#### 投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	カイプロリス 56mg/m <sup>2</sup> (1コース目のday1,2のみ20mg/m <sup>2</sup> )	div(30分で)	day1, 2, 8, 9, 15, 16
	注射用水(10mgあたり5mLで溶解)		
	5%ブドウ糖液 50mL		
Rp.2	5%ブドウ糖液 50mL	div(全開で)	day1, 2, 8, 9, 15, 16
Rp.3	レナデックス 20mg/body	p.o.(分1)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

【参考文献:Lancet.Oncol 2016;17:27-38 カイプロリス点滴静注用添付文書

【備考:1コース目のカイプロリス投与前後に250~500mLの輸液を投与する必要がある。】

【変法情報:】