

【 診療科:泌尿器科 】
 【 レジメン登録番号:UR-31 】

〈 dd-MVAC療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)												
			1	2	3	4	5	6	7	8	...	14			
メソトレキセート	30mg/m ²	div	○												
エクザール	3mg/m ²	div		○											
アドリアシン	30mg/m ²	div		○											
シスプラチン	70mg/m ²	div		○											

【1コース期間: 14 日】 【総コース数: 術前・術後は3~4コース】

【適応癌種: 膀胱癌、腎盂腫瘍、尿管腫瘍、尿路上皮癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF	div(6時間で)
Rp.2	メソトレキセート 30mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ソリューゲンF	div(6時間で)
Rp.4	ソリューゲンF	div(6時間で)

<day2>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	アプレピタントカプセル 125mg	p.o.
Rp.2	フィジオ140 500mL	div(6時間で)
Rp.3	フィジオ140 500mL	div(6時間で)
Rp.4	デキサート9.9mg	div(15分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.5	エクザール 3mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.6	アドリアシン 30mg/m ²	div(30分で)
	5%ブドウ糖液 100mL	
Rp.7	マンニトールS 300mL	div(30分で)
Rp.8	シスプラチン 70mg/m ²	div(120分で)
	生理食塩水(合計 500mL)	
Rp.8	フィジオ140 500mL	div(3時間で)
Rp.9	フィジオ140 500mL	div(6時間で)

<day3~4>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF	div(6時間で)
Rp.2	アプレピタントカプセル 80mg	p.o.(day3~4)
Rp.3	デカドロン 8mg	p.o.
Rp.4	ソリューゲンF	div(6時間で)
Rp.5	ソリューゲンF<day3のみ>	div(6時間で)
Rp.6	ソリューゲンF<day3のみ>	div(6時間で)

<day5>

Rp.1	デカドロン 8mg	p.o.
------	-----------	------

【参考文献: J Clin Oncol 2001;19:2638-46 , JAMA Oncol.2018;11:1535-42

【備考: アドリアシンは総投与量を500mg/m²以下とする。

【備考: Day4からG-CSF(ジラスタ又はフィルグラステム)による1次予防を行うこと。

】
 】
 】