

【 診療科:泌尿器科 】  
 【 レジメン登録番号:UR-16】

〈 GN療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)													
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	15	.....	28		
ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	div	○									○				○
アクブラ	80mg/m <sup>2</sup>	div	○													

【1コース期間: 28日】                      【総コース数:3 コース】

【適応癌種: 尿路上皮癌   】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
白血球数	2,000/ $\mu$ L未満	中断	2,000/ $\mu$ L以上
血小板数	7万/ $\mu$ L未満	中断	7万/ $\mu$ L以上
CCr	40mL/min未満	アクブラ60mg/m <sup>2</sup> へ	

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソルデム3A 1000mL	div(80mL/h)
Rp.2	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 13.2mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ジェムザール 1000mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
	5%ブドウ糖液 100mL	
Rp.4	アクブラ 80mg/m <sup>2</sup>	div(120分で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.5	ソルデム3A 1000mL	div(80mL/h)
Rp.6	ソリューゲンF 500mL	div(100mL/h)
Rp.7	ラシックス 20mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	

<day8,15>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソルデム3A 1000mL	div(100mL/h)
Rp.2	ソルデム3A 1000mL	div(100mL/h)
Rp..3	ジェムザール 1000mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
	5%ブドウ糖液 100mL	
Rp.4	ソルデム3A 1000mL	div(100mL/h)

【参考文献:

【備考:

【変法情報:

】  
 】  
 】