

【診療科:血液内科】
 【レジメン登録番号:IG-31】

< CHASE療法 >

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	21(28)			
エンドキサン	1200mg/m ²	div	○														
シタラビン	2000mg/m ²	div		○	○												
エトポシド	100mg/m ²	div	○	○	○												

【1コース期間:21(28)日】 【総コース数: 4 コース】

【適応癌種:中・高悪性度非ホジキンリンパ腫(60歳以下の再発例に対して)】

【時期:術前、術後 **手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 19.8mg	div(1時間かけて)
	生理食塩液 100mL	
Rp.2	5-HT ₃ RB 1A	div(全開で)
	生理食塩液 50mL	
Rp.3	エンドキサン 1200mg/m ²	div(3時間かけて)
	生理食塩液 500mL	
Rp.4	エトポシド 100mg/m ²	div(2時間かけて)
	5%Glu 500mL	
Rp.5	デキサート 19.8mg	div(1時間かけて)
	生理食塩液 100mL	

<day2~3>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 19.8mg	div(1時間かけて)
	生理食塩液 100mL	
Rp.2	5-HT ₃ RB 1A	div(全開で)
	生理食塩液 50mL	
Rp.3	シタラビン 2000mg/m ²	div(3時間かけて)
	5%Glu 500mL	
Rp.4	エトポシド 100mg/m ²	div(2時間かけて)
	5%Glu 500mL	
Rp.5	デキサート 19.8mg	div(1時間かけて)
	生理食塩液 100mL	

【参考文献:】

【備考:G-CSF製剤(2μg/kg)をday5から投与開始する。】

【変法情報:

】