

【 診療科:婦人科】

【 レジメン登録番号:GY-35 】

< Gemcitabine + Carboplatin + Bevacizumab療法 >

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)															
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	21				
ジェムザール	1,000mg/m ²	div	○												○			
カルボプラチン	AUC 4	div	○															
アバステン	15mg/kg	div	○															

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 6コース(奏効すれば最大10コース)】

【適応癌種: 卵巣癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
好中球数	1500未満	中止	
ヘモグロビン	8.5未満	中止	
血小板数	10万未満	中止	

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	アバステン 15mg/kg	div(初回90分、2回目60分、3回目以降30分でも可)
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	デキサート 6.6mg	div(30分で)
	5-HT ₃ RB 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ジェムザール 1,000mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	カルボプラチン AUC 4	div(1時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.5	生理食塩水 50 mL	div(フラッシュ用、全開で)

<day8>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 6.6mg	div(30分で)
	5-HT ₃ RB 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	ジェムザール 1,000mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	生理食塩水 50 mL	div(フラッシュ用、全開で)

【参考文献: J Clin Oncol 30:2039-2045.

】 【備考: 6コース(奏効すれば最大10コース)投与終了後、PDまでアバステン単剤にてメンテナンスを行う。

【変法情報:

】
】