

【 診療科:泌尿器科 】

【 レジメン登録番号:UR-36 】

## 〈 Pembrolizumab (q6w) + Axitinib療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)	
			1	42
キイトルーダ	400mg/body	div	○	
インライタ	10mg/body	p.o	←	Day1 ~42まで内服 →

【1コース期間: 42 日】

【総コース数: 制限なし】

【適応癌種: 腎細胞癌】

【時期: 術前、術後 **手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

### 投与プロトコール

〈第1日目〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	キイトルーダ 400mg/body	div(30分で)	day1
	生理食塩水 100mL <sup>※①</sup>		
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(30分で)	day1
Rp.3	インライタ 10mg/body	p.o.(分2)	day1~42

【参考文献:N Engl J Med 2019;380:1116-27. キイトルーダ点滴静注添付添付文書(2021年8月改訂)】

【備考:※①インラインフィルター(0.2~5μm)を用いて投与すること。最終濃度が1~10mg/mLとなるように調製すること。】