

【 診療科:呼吸器内科 】
 【 レジメン登録番号:IP-12 】

〈 CDDP+VP-16療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	28			
シスプラチン	80mg/m ²	div	○														
エトポシド	100mg/m ²	div	○	○	○												

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: 4~6 コース】

【適応癌種: 小細胞肺癌(ED)】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
WBC	3,000 μ L/未満	中止	
Plt	100,000/ μ L未満	中止	

投与プロトコル

〈day1〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 6.6mg *	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	エトポシド 100mg/m ²	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.3	生理食塩水 500mL	div(120分で)
Rp.4	シスプラチン 80mg/m ²	div(120分で)
	生理食塩水 計500mL※	
Rp.5	マンニトールS 300mL	Rp.6と同時に 側管からdiv(240分で)
Rp.6	ソリューゲンF 500mL	div(120分で)
Rp.7	ソリューゲンF 500mL	div(120分で)
Rp.8	ソリューゲンF 500mL	div(40mL/hr)

* イメンド投与時は半量

※下記備考欄参照

〈day2,3〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	div(6時間で)
Rp.2	ソリューゲンF 500mL	div(6時間で)
Rp.3	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 6.6mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	エトポシド 100mg/m ²	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.5	ソリューゲンF 500mL	div(6時間で)
Rp.6	ソリューゲンF 500mL	div(6時間で)

【参考文献:】

【備考: 第1日目Rp.4はシスプラチンと生理食塩水を合わせて500mLとなるように、生理食塩水の量を調整する。】

【 第1日目~3日目は朝と夕に体重を測定し、前回よりも2kg以上増加時は、ラシックス10mg(0.5A) + 生理食塩水50mLのdivを行う。】

【 Day2,3のエトポシドは、内服の場合もあり(投与量は注射と同じ)。】

【変法情報:】