

【 診療科:血液腫瘍内科】  
 【 レジメン登録番号:IG-102a 】

## 〈 SAL-AIDA2000 Induction therapy 〉

|        | 投与量                 | 投与経路 | 投与スケジュール(day)   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |
|--------|---------------------|------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|
|        |                     |      | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ..... |  |
| イダマイシン | 12mg/m <sup>2</sup> | div  |                 | ○ |   | ○ |   | ○ |   | ○ |       |  |
| ベサノイド  | 45mg/m <sup>2</sup> | p.o. | ← CRになるまで連日服用 → |   |   |   |   |   |   |   |       |  |

【1コース期間:CRになるまで】

【総コース数:1コース】

【適応癌種:急性前骨髄性白血病】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
|    |    |      |          |
|    |    |      |          |

### 投与プロトコール

<day2,4,6,8>

| Rp   | 薬剤名                        | 投与経路(速度)  |
|------|----------------------------|-----------|
| Rp.1 | 5-HT <sub>3</sub> RB 1A    | div(全開で)  |
|      | 生理食塩液 50mL                 |           |
| Rp.2 | イダマイシン 12mg/m <sup>2</sup> | div(1時間で) |
|      | 注射用水 20mL                  |           |
|      | 5%Glu 100mL                |           |

<day1~連日>

| Rp   | 薬剤名                       | 投与経路(速度) |
|------|---------------------------|----------|
| Rp.1 | ベサノイド 45mg/m <sup>2</sup> | p.o.     |

【参考文献:Ann Hematol(2015)94:557-563】

【備考:本レジメン終了後、CRとなった場合はConsolidation①へ移行する。(ハイリスク群、非ハイリスク群のいずれかに割り付けられる。)】

【変法情報:イダマイシンをDay1、3、5、7で投与する場合もある。】