

【 診療科:血液内科】
 【 レジメン登録番号:IG-24 】

〈 MTX-Ara-C療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	21			
メトレキサート	200mg/m ²	div	○														
メトレキサート	800mg/m ²	div	○														
シタラビン	3000mg/m ² ×2	div		○	○												

【1コース期間:21日】 【総コース数:HyperCVAD療法と交互に4コース繰り返す】

【適応癌種:急性リンパ性白血病】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソル・マトロール(40) 1V	div(30分かけて)
	5-HT ₃ RB 1A	
	生理食塩液 100mL	
Rp.2	メトレキサート 200mg/m ²	div(2時間かけて)
	生理食塩液 200mL	
Rp.3	メトレキサート 800mg/m ²	div(22時間かけて) 10~30mL/hで調整可
	生理食塩液 500mL	
Rp.4	ソル・マトロール(40) 1V	div(30分かけて)
	5-HT ₃ RB 1A	
	生理食塩液 100mL	

<day2~3>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソル・マトロール(40) 1V	div(30分かけて)
	5-HT ₃ RB 1A	
	生理食塩液 100mL	
Rp.2	シタラビン 3000mg/m ²	div(3時間かけて)
	生理食塩液 500mL	
Rp.3	ソル・マトロール(40) 1V	div(30分かけて)
	5-HT ₃ RB 1A	
	生理食塩液 100mL	
Rp.4	シタラビン 3000mg/m ²	div(3時間かけて)
	生理食塩液 500mL	

※全量500mLとなるよう適宜調整

※全量500mLとなるよう適宜調整

【参考文献:

】

【備考①:血球が回復したら次コースへ進む。】

【備考②:メトレキサート開始または終了後、12~24時間後からロイコボリン15mg/生食100mLを6時間ごとに投与する。】