

【 診療科:呼吸器内科 】
 【 レジメン登録番号:IP-45 】

〈 Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)			
			1	22
オプジーボ	360mg	div	○		○	
ヤーボイ	1mg/kg	div	○			
アリムタ	500mg/m ²	div	○		○	
カルボプラチン	AUC:5~6	div	○		○	

【1コース期間: 42 日】 【総コース数: 1コースのみ】

【適応癌種: 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	オプジーボ 360mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL ^{※1}	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(30分で)
Rp.3	ヤーボイ 1mg/kg	div(30分で)
	生理食塩水 30mL ^{※2}	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.5	デキサート 6.6mg	div(15分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
Rp.6	生理食塩水 50mL	div(10分で)
	アリムタ 500mg/m ²	
Rp.7	生理食塩水 100mL	div(60分で)
	カルボプラチン (AUC:5~6) × (GFR+25)	
Rp.8	5%ブドウ糖液 250mL	div(全開で)
	生理食塩水 50mL	

<day22>

Rp	薬剤名	投与経路
Rp.1	オプジーボ 360mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL ^{※1}	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.3	デキサート 6.6mg	div(15分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(10分で)
	アリムタ 500mg/m ²	
Rp.5	生理食塩水 100mL	div(60分で)
	カルボプラチン (AUC:5~6) × (GFR+25)	
Rp.6	5%ブドウ糖液 250mL	div(全開で)
	生理食塩水 50mL	

【参考文献:Lancet Oncol 2021;22:198-211】

【備考 ※1:投与時の総液量は体重30kg 以上の患者には150mL 以下、体重30kg 未満の患者には100mL 以下とする。】

【備考 ※2:最終濃度が1~4mg/mLとなるように希釈すること。】

【備考 葉酸:本剤初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。

なお、本剤の投与を中止又は終了する場合には、本剤最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。】

【備考 ビタミンB12:本剤初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。】

【備考 オプジーボとヤーボイはインラインフィルター(0.2又は0.22μm)を用いて投与すること。】

【備考:1コース終了後、オプジーボ+ヤーボイによる維持療法を行う。(IP-43)】