

【 診療科:乳腺外科 】

【 レジメン登録番号:SB-12 】

〈 DTX + Trastuzumab(q3w)療法 〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | | |
|-----------|------------------------|------|---------------|-------|---|-------|----|-------|----|--|
| | | | 1 | | 8 | | 15 | | 21 | |
| ドセタキセル | 60~75mg/m ² | div | ○ | | | | | | | |
| トラスツズマブBS | 初回 8mg/kg 以降 6mg/kg | div | ○ | | | | | | | |

【1コース期間: 21日】

【総コース数: コース】

【適応癌種: 乳癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
| | | | |
| | | | |

投与プロトコール

<day1>

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|-------------------------------|------------------------------|
| Rp.1 | トラスツズマブBS 初回 8mg/kg | div(初回90分で) (2回目から30分でも可) |
| | 生理食塩水 250mL | |
| Rp.2 | デキサート 6.6mg | div(30分で) |
| | 生理食塩水 50mL | |
| Rp.3 | ドセタキセル 60~75mg/m ² | div(1時間で) |
| | 5%ブドウ糖液 250mL | |

【参考文献: Marty M, et al. J Clin Oncol. 2005 : 23 : 4265-4274

【備考:

【変法情報:

】
】
】