

【 診療科:血液内科 】
 【 レジメン登録番号:IG-110 】

〈 Pola-BR療法 〉

【1コース目】

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | |
|----------|----------------------|------|---------------|---|---|-------|----|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 21 | | |
| トレアキシシ | 90mg/m ² | div | ○ | ○ | | | | | |
| ポライビー | 1.8mg/kg | div | ○ | | | | | | |
| リツキシマブBS | 375mg/m ² | div | ○ | | | | | | |

【2コース目以降】

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | |
|----------|----------------------|------|---------------|---|---|-------|----|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 21 | | |
| トレアキシシ | 90mg/m ² | div | ○ | ○ | | | | | |
| ポライビー | 1.8mg/kg | div | ○ | | | | | | |
| リツキシマブBS | 375mg/m ² | div | ○ | | | | | | |

【1コース期間:21日】 【総コース数: 6コース】

【適応癌種:びまん性大細胞型リンパ腫(再発・難治性)】

【時期: 術前、術後 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
| | | | |

投与プロトコール

【1コース目】

【第1日目】

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|--|------------------------------|
| Rp.1 | ポララミン 5mg | iv ワンショット (リツキシマブ投与30分前) |
| | ソル・コーテフ100mg | |
| Rp.2 | リツキシマブBS 375mg/m ² ^{備考1} | div (25~200mL/h 2~3時間かけて) |
| | 生理食塩液 500mL | |

【第2日目】

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|----------------------------|-------------|
| Rp.1 | 5-HT ₃ RB | div(全開で) |
| | 生理食塩液 50mL | |
| Rp.2 | トレアキシシ 90mg/m ² | div(1時間かけて) |
| | 注射用水 40mL×本数 | |
| | 生理食塩液 200mL | |
| Rp.3 | ポララミン 5mg | iv ワンショット |
| | ソル・コーテフ100mg | |
| Rp.4 | 生理食塩液 50mL | div(30分で) |
| Rp.5 | ポライビー 1.8mg/kg | div(90分かけて) |
| | 注射用水 20mL ^{備考2} | |
| | 生理食塩液 100mL ^{備考3} | |

【第3日目】

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|----------------------------|-------------|
| Rp.1 | 5-HT ₃ RB | div(全開で) |
| | 生理食塩液 50mL | |
| Rp.2 | トレアキシシ 90mg/m ² | div(1時間かけて) |
| | 注射用水 40mL×本数 | |
| | 生理食塩液 200mL | |

【2コース目以降】

【第1日目】

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|--|------------------------------|
| Rp.1 | 5-HT ₃ RB | div(全開で) |
| | 生理食塩液 50mL | |
| Rp.2 | トレアキシシ 90mg/m ² | div(1時間かけて) |
| | 注射用水 40mL×本数 | |
| | 生理食塩液 200mL | |
| Rp.3 | ポララミン 5mg | iv ワンショット |
| Rp.4 | ソル・コーテフ100mg | div(30分で) |
| Rp.5 | リツキシマブBS 375mg/m ² ^{備考1} | div (25~200mL/h 2~3時間かけて) |
| | 生理食塩液 500mL | |

【第2日目】

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|----------------------------|-------------------------------|
| Rp.1 | 5-HT ₃ RB | div(全開で) |
| | 生理食塩液 50mL | |
| Rp.2 | トレアキシシ 90mg/m ² | div(1時間かけて) |
| | 注射用水 40mL×本数 | |
| | 生理食塩液 200mL | |
| Rp.3 | ポララミン 5mg | iv ワンショット |
| | ソル・コーテフ100mg | |
| Rp.4 | 生理食塩液 50mL | div(30分で) |
| Rp.5 | ポライビー 1.8mg/kg | div(90分かけて、忍容性 あれば30分に短縮可) |
| | 注射用水 20mL ^{備考2} | |
| | 生理食塩液 100mL ^{備考3} | |

【参考文献: J Clin Oncol 2019;38:155-165, ポライビー点滴静注用添付文書】
 【備考1: 生食の量を調節し、概ね10倍希釈となるようにする。】
 【備考2: 30mg製剤は注射用水1.8mLで、140mg製剤は注射用水7.2mLで溶解。】
 【備考3: 希釈後の濃度は0.72~2.70mg/mLになるよう調製する。インラインフィルター(0.2または0.22ミクロン)を用いて投与すること。】
 【備考: リツキシマブBS、ポライビー投与の30分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤等の前投与を行うこと。G-CSF製剤の予防投与が推奨されている。】