

【 診療科: 乳腺外科】

【 レジメン登録番号: SB-03 】

### 〈 EC療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	15	.....	21						
エピルビシン	75~90mg/m <sup>2</sup>	div	○																	
エンドキサン	600mg/m <sup>2</sup>	div	○																	

【1コース期間: 21日】

【総コース数: コース】

【適応癌種: 乳癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

#### 投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 9.9mg	div(30分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	5-HT <sub>3</sub> RB 1A	div(10分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	エピルビシン 75~90mg/m <sup>2</sup>	div(10分で)
	5%ブドウ糖液 50mL	
Rp.4	エンドキサン 600mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	

【参考文献: 乳癌診療ガイドライン等】

【備考: 術後補助療法では4回、再発進行症例の治療では1~10回位繰り返し実施。】

【変法情報:】