

【 診療科:乳腺外科 】
 【 レジメン登録番号:SB-41】

〈 Atezolizumab+nab-PTX療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)							
			1	8	15	28	
テセントリク	840mg	div	○					○		
アブラキサン	100mg/m ²	div	○		○			○		

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: 制限なし】

【適応癌種: 乳癌(PD-L1陽性・TNBC)】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

<day1, 15>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	テセントリク 840mg	div(60分で、 2回目以降30分可) ^{※1}
	生理食塩水 250mL	
Rp.2	生理食塩液 50mL	div(全開で)
Rp.3	デキサート 3.3mg	div(30分で)
	生理食塩液 50mL	
Rp.4	アブラキサン 100mg/m ²	div(30分で) ^{※2}
	生理食塩液 50mL	
Rp.5	生理食塩水 50mL	div(全開で)

<day8>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 3.3mg	div(30分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	アブラキサン 100mg/m ²	div(30分で) ^{※2}
	生理食塩液 50mL	
Rp.3	生理食塩水 50mL	div(全開で)

【参考文献: テセントリク添付文書、N Engl J Med 2018;379:2108-21】

【備考: ※1: 初回60分で投与、2回目以降は忍容性あれば30分でも可、インラインフィルターを用いて投与すること。

※2: インラインフィルターを用いずに投与すること。】