

【 診療科:血液腫瘍内科 】  
 【 レジメン登録番号:IG-98 】

〈 E-Pd療法 〉

〈1～2コース〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)															
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	22	23	...	28		
レナデックス	28mg/body	p.o.	○			○				○						○		
デキサート	6.6mg	div	○			○				○						○		
エムブリシテ	10mg/kg	div	○			○				○						○		
ボマリスト	4mg/body	p.o.	← Day1～21まで内服														→	

〈3コース以降〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)															
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	22	23	...	28		
レナデックス	28mg/body	p.o.	○															
	40mg/body					○				○						○		
デキサート	6.6mg	div	○															
エムブリシテ	20mg/Kg	div	○															
ボマリスト	4mg/body	p.o.	← Day1～21まで内服														→	

【1コース期間:28日間】 【総コース数: 】

【適応癌種:多発性骨髄腫】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
薬剤投与基準量			

投与プロトコール

〈1～2コース〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	レナデックス 28mg/body	p.o.(分1)	day1, 8, 15, 22
Rp.2	デキサート 6.6mg	div(15分間で)	day1, 8, 15, 22
	生理食塩水 50mL		
Rp.3	ボラミン注1A	div(15分間で)	day1, 8, 15, 22
	ガスター注1A		
	アセリオ注 100mL		
Rp.4	生食 100mL	div(30分間で)	day1, 8, 15, 22
	エムブリシテ10mg/kg		
	注射用水※1		
Rp.5	生食 250mL	div(添付文書参考に)	day1, 8, 15, 22
	ボマリスト 4mg/body		
Rp.6	ボマリスト 4mg/body	p.o.(分1)	day1～21

〈3コース以降〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	レナデックス 28mg/body	p.o.(分1)	day1
	レナデックス 40mg/body		day8, 15, 22
Rp.2	デキサート 6.6mg	div(15分間で)	day1
	生理食塩水 50mL		
Rp.3	ボラミン注1A	div(15分間で)	day1
	ガスター注1A		
	アセリオ注 100mL		
Rp.4	生食 100mL	div(30分間で)	day1
	エムブリシテ20mg/kg		
	注射用水※1		
Rp.5	生食 250mL	div(添付文書参考に)	day1
	ボマリスト 4mg/body		
Rp.6	ボマリスト 4mg/body	p.o.(分1)	day1～21

【参考文献:N Engl J Med. 2018;379(19):1811-1822. エムブリシテ点滴静注用添付文書】

【備考※1:エムブリシテの300mg製剤は注射用水13mL、400mg製剤は注射用水17mLで溶解。】

【備考2:エムブリシテは0.22ミクロン以下のインラインフィルターを通して投与する。】

【備考3:レナデックスは、エムブリシテ投与3～24時間前に内服する。】

【備考4:前投薬について】

デキサート:エムブリシテ投与の45分前までに投与を終了する。

ボラミン・ガスター:エムブリシテ投与の30分前までに投与を終了する。(ガスターは医師の判断で投与しない場合がある。)

アセリオ:エムブリシテ投与30～90分前までに投与する。(300～1000mg投与)

アセリオにボラミン・ガスター混注可

アセリオは体重にかかわらず、100mL投与可

アセリオはアセトアミノフェン錠に変更可

【実行情報:75歳超の場合、エムブリシテ投与がある日 レナデックス8mg/日、エムブリシテ投与がない日 レナデックス20mg/日】