

【診療科:血液内科】
 【レジメン登録番号:IG-4】

〈Highdose-AraC療法〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)				
			1	2	3	4	5
シタラビン	2000mg/m ² × 2	c.DIV	○	○	○	○	○

【1コース期間:血球の回復が見られたら次コース開始】

【総コース数: 3 コース】

【適応癌種:急性骨髄性白血病(M2, M4)】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
薬剤投与基準量	60歳以上	1500mg/m ² /回(但し必須ではない)	

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ RB 1A	div(全開で)
	ソル・マトロール(40) 1V	
	生理食塩液 50mL	
Rp.2	シタラビン 2000mg/m ²	div(3時間かけて)
	ソルテム3A 500mL ※	
Rp.3	5-HT ₃ RB 1A	div(全開で)
	ソル・マトロール(40) 1V	
	生理食塩液 50mL	
Rp.4	シタラビン 2000mg/m ²	div(3時間かけて)
	ソルテム3A 500mL ※	

※全量500mLとなるよう適宜調整

※全量500mLとなるよう適宜調整

【参考文献:】

【備考:ステロイド点眼剤などを予防的に投与することを考慮する。】

【変法情報:】