

【 診療科:乳腺外科 】
 【 レジメン登録番号:SB-19 】

〈 PTX+Bvacizumab療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)						
			1	8	15	28
パクリタキセル	90mg/m ²	div	○		○		○		
アバステン	10mg/kg	div	○				○		

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: PDまで】

【適応癌種: 手術不能または再発乳癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1, 15>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ポラミン 10mg	div(5分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	デキサート 6.6mg ^{※1}	div(30分で)
	H ₂ Blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	パクリタキセル 90mg/m ²	div(1時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(5分で)
Rp.5	アバステン 10mg/kg	div(90分で) ^{※2}
	生理食塩水 100mL	
Rp.6	生理食塩水 50mL	div(5分で)

<day8>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ポラミン 10mg	div(5分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	デキサート 6.6mg ^{※1}	div(30分で)
	H ₂ Blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	パクリタキセル 90mg/m ²	div(1時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(5分で)

【参考文献: 1) Miller K, et al. N Engl J Med. 2007 : 357 : 2666-2676.】

【 : 2) Robert NJ, et al. J Clin Oncol. 2011 : 29 : 1252-1260】

【備考: ※1; パクリタキセル2回目以降、デキサート3.3mgでも可。】

【備考: ※2...初回90分で投与、2回目は60分で可、3回目以降は30分で可。】