

【 診療科:乳腺外科 】
 【 レジメン登録番号:SB-07 】

〈 GEM + PTX 療法 〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | |
|---------|------------------------|------|---------------|-------|---|-------|----|-------|----|
| | | | 1 | | 8 | | 15 | | 21 |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | div | ○ | | ○ | | | | |
| ジェムザール | 1,250mg/m ² | div | ○ | | ○ | | | | |

【1コース期間: 21日】 【総コース数: コース】

【適応癌種: 転移再発乳癌(MBC)、進行再発乳癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
| | | | |
| | | | |

投与プロトコール

【day1, 8】

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|-------|---|-----------|
| Rp. 1 | ポララミン 10mg 生理食塩水 50mL | div(全開で) |
| Rp. 2 | デキサート 6.6mg ^{※1} H ₂ Blocker 1A 5-HT ₃ RBlocker 1A 生理食塩水 50mL | div(30分で) |
| Rp. 3 | 生理食塩水 50mL | div(30分で) |
| Rp. 4 | パクリタキセル 80mg/m ² 5%ブドウ糖液 250mL | div(60分で) |
| Rp. 5 | 生理食塩水 50mL | div(10分で) |
| Rp. 6 | ジェムザール 1,250mg/m ² 生理食塩水 100mL | div(30分で) |
| Rp. 7 | 生理食塩水 50mL | div(全開で) |

【参考文献:手術不能または転移・再発乳癌におけるゲムシタピン+分割パクリタキセルの第I/II相臨床試験】

【備考:※1: パクリタキセル2回目以降、デキサート3.3mgでも可。】

【変法情報:】