

【 診療科:婦人科 】
 【 レジメン登録番号:GY-16 】

〈 CPT-11+CDDP療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	28			
イリノテカン	60mg/m ²	div	○									○			○		
シスプラチン	60mg/m ²	div	○														

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: 6 コース】

【適応癌種: 卵巣癌(タキサン系薬剤使用不可時)】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

〈第0日目〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	div(1000~2000mL)

〈第1日目〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	div(120分で)
Rp.2	マグネゾール 20mL	div(120分で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.3	デキサート 9.9mg※1	div(30分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	イリノテカン 60mg/m ²	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.5	生理食塩水 500mL	div(120分)
Rp.6	シスプラチン 60mg/m ²	div(120分で)
	生理食塩水 500mL※2	
Rp.7	マンニトールS 300mL	Rp.8と同時に 側管からdiv(240分で)
Rp.8	ソリューゲンF 500mL	div(120分で)
Rp.9	ソリューゲンF 500mL	div(120分で)

〈第2,3日目〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	div(120分で)
Rp.2	ソリューゲンF 500mL	div(120分で)
Rp.3	デキサート 6.6mg※1	div(30分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	ソリューゲンF 500mL	div(120分で)
Rp.5	ソリューゲンF 500mL	div(120分で)

〈第8,15日目〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 6.6mg※1	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	イリノテカン 60mg/m ²	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

【参考文献:

【備考: ※1...デキサートの投与量は、イメンドカプセル併用時の量で設定してあります。イメンド不要時はデキサート倍量。】

【備考: ※2...生理食塩水の量はシスプラチンと合わせて500mLとなるようにする。】

【変法情報: