

【 診療科:血液内科】  
 【 レジメン登録番号:IG-74 】

## 〈 ESHAP療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)													
			1	2	3	4	5	.....	21(28)							
エトポシド	40mg/m <sup>2</sup>	div	○	○	○	○										
ソル・メドロール	500mg/body	div	○	○	○	○	○									
シタラビン	2000mg/m <sup>2</sup>	div					○									
シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	civ	○	○	○	○										

【1コース期間:21(28)日】 【総コース数: コース】

【適応癌種:非ホジキンリンパ腫】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

### 投与プロトコール

<day1~4>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソル・メドロール 500mg	div(30分かけて)
	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	エトポシド 40mg/m <sup>2</sup>	div(1時間かけて)
	生理食塩水 250mL	
Rp.3	シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup>	div(23時間かけて、 10-40mL/hrで調製可)
	生理食塩水 500mL	

<day5>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソル・メドロール 500mg	div(30分かけて)
	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	シタラビン 2000mg/m <sup>2</sup>	div(2時間かけて)
	生理食塩水 500mL <sup>※1</sup>	

【参考文献:①J Clin Oncol.1994;12;1169-1176  
 ②Haematologica.2008;93;1829-1836】

【備考※1:生理食塩水の量はシタラビンと合わせて500mLとなるようにする。】

【変法情報:】