

【 診療科:泌尿器科 】  
 【 レジメン登録番号:UR-5】

〈 GC療法 〉

|        | 投与量                   | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |   |   |   |   |   |   |       |    |       |    |  |  |   |
|--------|-----------------------|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|-------|----|--|--|---|
|        |                       |      | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ..... | 15 | ..... | 28 |  |  |   |
| ジェムザール | 1000mg/m <sup>2</sup> | div  | ○             |   |   |   |   |   |   |   |       |    | ○     |    |  |  | ○ |
| シスプラチン | 70mg/m <sup>2</sup>   | div  |               | ○ |   |   |   |   |   |   |       |    |       |    |  |  |   |

【1コース期間: 28日】      【総コース数:4 コース】

【適応癌種: 尿路上皮癌   】

【時期: ~~術前、術後、手術不能・進行・再発~~】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目   | 基準     | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|------|--------|------|----------|
| 白血球数 | 3000未満 | 中断   | 3000以上   |
| 血小板数 | 10万未満  | 中断   | 10万以上    |

投与プロトコール

<day1>

| Rp   | 薬剤名                            | 投与経路(速度)    |
|------|--------------------------------|-------------|
| Rp.1 | ソリューゲンF 500mL                  | div(80mL/h) |
| Rp.2 | 5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A | div(15分で)   |
|      | 生理食塩水 100mL                    |             |
| Rp.3 | ジェムザール 1000mg/m <sup>2</sup>   | div(30分で)   |
|      | 生理食塩水 100mL                    |             |
| Rp.4 | ソリューゲンF 500mL                  | div(80mL/h) |

<day3>

| Rp   | 薬剤名                            | 投与経路(速度)     |
|------|--------------------------------|--------------|
| Rp.1 | ソリューゲンF 500mL                  | div(80mL/h)  |
| Rp.2 | 5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A | div(15分で)    |
|      | デキサート 6.6mg                    |              |
|      | 生理食塩水 100mL                    |              |
| Rp.3 | ソリューゲンF 500mL                  | div(80mL/hで) |

<day2>

| Rp   | 薬剤名                            | 投与経路(速度)     |
|------|--------------------------------|--------------|
| Rp.1 | ソリューゲンF 500mL                  | 40mL/h       |
| Rp.2 | 5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A | div(15分で)    |
|      | デキサート 13.2mg                   |              |
|      | 生理食塩水 100mL                    |              |
| Rp.3 | シスプラチン 70mg/m <sup>2</sup>     | div(120分で)   |
|      | 生理食塩水(合計 500mL)                |              |
| Rp.4 | ラシックス 20mg                     | div(120分で)   |
|      | ソリューゲンF 500mL                  |              |
| Rp.5 | ソリューゲンF 500mL                  | div(80mL/hで) |

<day8,15>

| Rp   | 薬剤名                            | 投与経路(速度)    |
|------|--------------------------------|-------------|
| Rp.1 | ソリューゲンF 500mL                  | div(80mL/h) |
| Rp.2 | 5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A | div(15分で)   |
|      | 生理食塩水 100mL                    |             |
| Rp.3 | ジェムザール 1000mg/m <sup>2</sup>   | div(30分で)   |
|      | 生理食塩水 100mL                    |             |
| Rp.4 | ソリューゲンF 500mL                  | div(80mL/h) |

【参考文献:Long-Term Survival Results of a Randomized Trial Comparing Gemcitabine Plus Cisplatin, with Methotrexate , Vinblastine, Doxorubicin, Plus Cisplatin in Patients with Bladder Cancer】

【備考: イメンドを併用する場合は、day2のデキサートの投与量を6.6mgに減量すること。】

【変法情報:

】