

【 診療科:呼吸器外科 】
 【 レジメン登録番号:ST-16 】

〈 CBDCA + S-1 療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)					
			1	14	15	21
カルボプラチン	AUC 5	div	○					
ティーエスワン	BSA < 1.25m ² ; 80mg/body 1.25 ≤ BSA < 1.5m ² ; 100mg/body 1.5m ² ≤ BSA; 120mg/body	p.o. ^{※1}	○	←継続投与→		○		

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: 6 コース】

【適応癌種: 非小細胞肺癌】

【時期: 術前、術後 **手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
白血球数	3,000/μL以下	休薬	3,000/μL以上
血小板数	100,000/μL以下	休薬	100,000/μL以上

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 6.6mg	div(全開で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A ^{※2}	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	カルボプラチン AUC 5	div(1時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.3	生理食塩水 100mL	div(全開で)

【参考文献: JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY · VOLUME 28: 5240-5246

【備考: ※1: 処方タイミングにより、day1 夕 ~ day15 朝での内服となる場合もある。

【備考: ※2: 初回入院にて施行時の5-HT₃R Blockerは、DPCを考慮し、カイトリルで施行する。

【備考: 外来で施行する場合は、アロキシを選択しても構わない。

】
 】
 】
 】