

【 診療科:乳腺外科】  
 【 レジメン登録番号:SB-27 】

## 〈 dose-dense EC-P療法 〉

〈dose-dense EC療法〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)													
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	14				
エピルビシン	90mg/m <sup>2</sup>	div	○													
エンドキサン	600mg/m <sup>2</sup>	div	○													

【1コース期間: 14日】 【総コース数: 4コース】

〈dose-dense P療法〉 ※dose-dense EC療法4コース終了後に開始

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)													
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	14				
パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	div	○													

【1コース期間: 14日】 【総コース数: 4コース】

【適応癌種: 乳癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

〈dose-dense EC療法〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 9.9mg	div(30分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	5-HT <sub>3</sub> RB 1A	div(10分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	エピルビシン 90mg/m <sup>2</sup>	div(10分で)
	5%ブドウ糖液 50mL	
Rp.4	エンドキサン 600mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.5	生理食塩液 50mL	div(全開で)

〈dose-dense P療法〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 16.5mg	div(全開で)
	ガスター 20mg	
	ポララミン 10mg 生理食塩水 50mL	
Rp.2	5-HT <sub>3</sub> RB 1A	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	パクリタキセル 175mg/m <sup>2</sup>	div(3時間で)
	5%ブドウ糖液 500mL	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(全開で)

【参考文献: Lancet 2015;385:1863-1872】

【備考: 各コース共、ジラスタの予防的投与を行う。ジラスタは抗癌剤投与24時間以上経過後、出来るだけ速やかに投与すること。  
 また、EC療法ではアプレピタントを併用すること。併用しない場合はデキサートの量を9.9mg→19.8mgへ増量すること。】

【変法情報:

】