

【 診療科:消化器外科 】
 【 レジメン登録番号:SG-34 】

< IRIS療法【大腸癌用】 >

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------|---------------|---|---|---|---|---|---|-------|----|------------|-------|----|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 14 | 15 | | 28 | | |
| イリノテカン | 125mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ |
| TS-1 | 80~120mg/body | p.o. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ←継続投与 → | ○ | | | |

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: コース】

【適応癌種: 切除不能大腸癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|-------|---------|------|----------|
| WBC | 3,000以下 | 中止 | 3,000以上 |
| Plt | 10万以下 | 中止 | 10万以上 |
| T-Bil | 3以上 | 中止 | 3以下 |

投与プロトコール

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|---|---------------------------|
| Rp.1 | YDソリタT3 200mL | div(80mL/h) 終了後抜針, 残破棄 |
| Rp.2 | デキサート 6.6mg | div(30分で) |
| | 5-HT ₃ R Blocker 1A 生理食塩水 100mL | |
| Rp.3 | イリノテカン 125mg/m ² | div(90分で) |
| | 生理食塩水 500mL | |

【参考文献:無作為第Ⅲ相試験(FIRIS study)でFOLFIRIに対し非劣性が証明されている】

【備考:TS-1投与量 BSA<1.25m²,80mg/day; 1.25≦BSA<1.5,100mg/day; BSA≧1.5,120mg/day】

【変法情報:】