

【 診療科:呼吸器外科 】  
 【 レジメン登録番号:ST-1 】

〈 weekly ナベルビン+アクプラ療法 〉

|       | 投与量                 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |   |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |  |   |
|-------|---------------------|------|---------------|---|---|-------|---|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|--|---|
|       |                     |      | 1             | 2 | 3 | ..... | 8 | ..... | 15 | ..... | 22 | ..... | 29 | ..... | 35 |  |   |
| ナベルビン | 10mg/m <sup>2</sup> | div  | ○             |   |   |       |   | ○     |    |       |    |       | ○  |       |    |  | ○ |
| アクプラ  | 30mg/m <sup>2</sup> | div  | ○             |   |   |       |   | ○     |    |       |    |       | ○  |       |    |  | ○ |

【1コース期間: 35 日】 【総コース数: 2 コース(計10回)】

【適応癌種:非小細胞肺癌】

【時期: 術前 **術後**、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目      | 基準                                 | 減量内容      | 休薬時の再開基準 |
|---------|------------------------------------|-----------|----------|
| 薬剤投与基準量 | 骨髄抑制(WBC<3000 or Hb<10 or PLT<10万) | 中止        |          |
| 薬剤投与基準量 | 発熱>37.5℃                           | 中止        |          |
| 薬剤投与基準量 | GOT/GPT>100                        | 中止        |          |
| 薬剤投与基準量 | UN/Cre 悪化                          | 80%量または中止 |          |
| 薬剤投与基準量 | 強度の食欲不振 or 全身倦怠感 or 嘔吐             | 80%量または中止 |          |

投与プロトコール

| Rp   | 薬剤名                            | 投与経路(速度)  |
|------|--------------------------------|-----------|
| Rp.1 | デキサート 3.3mg                    | div(10分で) |
|      | 5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A |           |
|      | 生理食塩水 100mL                    |           |
| Rp.2 | アクプラ 30mg/m <sup>2</sup>       | div(60分で) |
|      | 生理食塩水 200mL                    |           |
| Rp.3 | ナベルビン 10mg/m <sup>2</sup>      | div(10分で) |
|      | 生理食塩水 100mL                    |           |
| Rp.4 | 生理食塩水 100mL                    | div(全開で)  |

【参考文献:

【備考:

【変法情報:

】

】

】