

【 診療科:婦人科 】  
 【 レジメン登録番号:GY-25 】

〈 AP療法 〉

|        | 投与量                 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |   |   |   |   |   |   |       |    |       |    |  |  |  |  |
|--------|---------------------|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|-------|----|--|--|--|--|
|        |                     |      | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ..... | 15 | ..... | 21 |  |  |  |  |
| アドリアシン | 60mg/m <sup>2</sup> | div  | ○             |   |   |   |   |   |   |   |       |    |       |    |  |  |  |  |
| シスプラチン | 50mg/m <sup>2</sup> | div  | ○             |   |   |   |   |   |   |   |       |    |       |    |  |  |  |  |

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 6 コース】

【適応癌種: 子宮体癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目   | 基準     | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|------|--------|------|----------|
| 白血球数 | 3000以下 | 80%量 | 3000以上   |
| 血小板数 | 10万以下  | 中止   | 10万以上    |

投与プロトコール

〈day1〉

| Rp   | 薬剤名                            | 投与経路(速度)                   |
|------|--------------------------------|----------------------------|
| 前日より | ソルラクト 500mL                    | div(120mL/h)               |
| Rp.1 | ソルデム3A 1000mL                  | div(250mL/h) <sup>※1</sup> |
| Rp.2 | 5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A | div(全開)                    |
|      | H <sub>2</sub> Blocker 1A      |                            |
|      | デキサート 16.5mg                   |                            |
| Rp.3 | 生理食塩水 100mL                    | 側管div(10分で)                |
|      | アドリアシン 60mg/m <sup>2</sup>     |                            |
| Rp.4 | 5%ブドウ糖液 50mL                   | div(2時間で)                  |
|      | シスプラチン 50mg/m <sup>2</sup>     |                            |
| Rp.5 | 生理食塩水 500mL <sup>※2</sup>      | 側管div(300mL/h)             |
| Rp.6 | マンニトールS 300mL                  | div(250mL/h)               |
| Rp.7 | ソルデム3A 1000mL                  | div(120mL/h) <sup>※3</sup> |

〈day2~4〉

| Rp   | 薬剤名           | 投与経路(速度)  |
|------|---------------|---|
| Rp.1 | ソルデム3A 1000mL | div(day2 120mL/h)<br>(day3 80mL/h)<br>(day4 40mL/h) |
| Rp.2 | デキサート 3.3mg   | div<br>(全開 1日2回朝・夕)                                 |
|      | テルペラン 1A      |   |
|      | 生理食塩水 100mL   |   |

【参考文献: 子宮体癌治療ガイドライン2009、及び伊勢原APレジメン(JGOG2043、子宮体癌・再発高危険群に対する術後補助化学療法としてのAP療法、DP療法、TC療法のランダム化第Ⅲ相試験)】

【備考: ※1・・・シスプラチン投与持、止め。】  
 【備考: ※2・・・第1日目のRp.4の生理食塩水の量はシスプラチンと合わせて500mLとなるようにする。】  
 【備考: ※3・・・0時で残破棄して、更新。】  
 【備考: 2時間尿量100mL以下の場合、ラシックス(20mg) 0.5A/生食50mL。】  
 【変法情報:】