

【 診療科: 婦人科】

【 レジメン登録番号: GY-28 】

### 〈 TC+Bevacizumab療法 〉

|         | 投与量                  | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |   |   |   |   |   |   |       |    |       |    |  |  |  |
|---------|----------------------|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|-------|----|--|--|--|
|         |                      |      | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ..... | 15 | ..... | 21 |  |  |  |
| アバステチン  | 15mg/kg              | div  | ○             |   |   |   |   |   |   |   |       |    |       |    |  |  |  |
| パクリタキセル | 180mg/m <sup>2</sup> | div  | ○             |   |   |   |   |   |   |   |       |    |       |    |  |  |  |
| カルボプラチン | AUC:5~6              | div  | ○             |   |   |   |   |   |   |   |       |    |       |    |  |  |  |

【1コース期間: 21日】

【総コース数: 6コース(終了後はアバステチン単剤へ)】

【適応癌種: 卵巣癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
|    |    |      |          |
|    |    |      |          |

#### 投与プロトコール

| Rp   | 薬剤名                          | 投与経路(速度)                    |
|------|------------------------------|-----------------------------|
| Rp.1 | アバステチン 15mg/kg               | div(初回90分、2回目60分、3回目以降30分で) |
|      | 生理食塩水 100mL                  |                             |
| Rp.2 | H <sub>2</sub> Blocker 1A    | div(10分で)                   |
|      | デキサート 19.8mg                 |                             |
|      | ポララミン 5mg                    |                             |
|      | 生理食塩水 50mL                   |                             |
| Rp.3 | 5HT <sub>3</sub> RBlocker 1A | div(30分で)                   |
|      | 生理食塩水 50mL                   |                             |
| Rp.4 | パクリタキセル 180mg/m <sup>2</sup> | div(180分で)                  |
|      | 5%ブドウ糖 500mL                 |                             |
| Rp.5 | カルボプラチン AUC:5~6              | div(60分で)                   |
|      | 5%ブドウ糖 250mL                 |                             |
| Rp.6 | 生理食塩水 50mL                   | div(フラッシュ用、全開で)             |

【参考文献: Incorporation of Bevacizumab in the Primary Treatment of Ovarian Cancer. N Engl J Med 2011;365:2473-83】

【変法情報: イmend(アプレピタント)使用時は、デキサートの投与量を 9.9mg/回に半減する。】