【　診療科：婦人科】
【　レジメン登録番号：GY-30　】

〈　PLD+Bevacizumab療法　〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール（day）								
			1	2	3	4	5	・・・・・	15	・・・・	28
アバスチン	10mg/kg	div	○						○		
ドキシル	40mg/㎡	div	○								

【1コース期間：　28　日】　　　　【総コース数：　　　コース】

【適応癌種：卵巣癌　　】

【時期：　術前　、　術後　、[✓ 手術不能・進行・再発]】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

＜day1＞

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	アバスチン　10mg/kg	div（初回90分、2回目60分、3回目以降30分でも可）
	生理食塩水　100mL	
Rp.2	デキサート 6.6mg	div（15分で）
	5%ブドウ糖　50mL	
Rp.3	ドキシル 40mg/m^2	div(1mg/分で)
	5%ブドウ糖 250 mL	
Rp.4	5%ブドウ糖 50 mL	div(フラッシュ用、全開で)

＜day15＞

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	アバスチン　10mg/kg	div（初回90分、2回目60分、3回目以降30分でも可）
	生理食塩水　100mL	
Rp.2	生理食塩水 50 mL	div(フラッシュ用、全開で)

【参考文献：J Clin Oncol.2014 : 32 ; 1302-1308　　　　　　　　　　】
【備考：ドキシルはフィルター通さずに投与すること。また溶解は5%Gluのみ可。】
【変法情報：アバスチンを15mg/kgで4週毎行う場合もある。　　　　　】