

【 診療科:血液腫瘍内科 】
 【 レジメン登録番号:IG-106 】

〈 BR療法(DLBCL用) 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)			
			1	2	21
トレアキシシ	120mg/m ²	div	○	○		
リツキシマブBS	375mg/m ²	div	○			

【1コース期間:21日】 【総コース数: 6】

【適応癌種:びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(再発・難治性)】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

【第1日目】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ RB	div(全開で)
	生理食塩液 50mL	
Rp.2	トレアキシシ 120mg/m ²	div(1時間かけて)
	生理食塩液 250mL	
Rp.3	ポララミン 5mg	iv ワンショット
	ソル・コーテフ 100mg	
Rp.4	リツキシマブBS 375mg/m ² ^{備考1}	div(25~200mL/h 2~3時間かけて)
	生理食塩液 500mL	

【第2日目】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ RB	div(全開で)
	生理食塩液 50mL	
Rp.2	トレアキシシ 120mg/m ²	div(1時間かけて)
	生理食塩液 250mL	

【参考文献: J Clin Oncol 31:2103-09:2013 , トレアキシシ点滴静注用添付文書】

【備考1:生食の量を調節し、概ね10倍希釈となるようにする。】

【変法情報:

】