

【診療科:血液内科】
【レジメン登録番号:IG-111】

〈 DKd(Daratumumab+Carfilzomib+Dexamethasone)療法 〉

【1コース】

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)											
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	28
デキサート	16.5mg/body/day	div	○	○		○					○			○
ダラザレックス	16mg/kg (Day1,2は8mg/kg)	div	○	○		○					○			○
カイプロリス	56mg/m ² (Day1,2は20mg/m ²)	div	○	○		○	○				○	○		○
レナデックス錠	20mg/body/day	p.o.					○						○	

【2コース】

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)											
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	28
デキサート	16.5mg/body/day	div	○			○					○			○
ダラザレックス	16mg/kg	div	○			○					○			○
カイプロリス	56mg/m ²	div	○	○		○	○				○	○		○
レナデックス錠	20mg/body/day	p.o.				○					○			○

【1コース期間:28日】

【2コース数:制限無し】

【適応症種:多発性骨髄腫】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【1コース】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	ボララミン 5mg	div(15分)	day1,2,8,15,22
	アゼリオ 500mg		
Rp.2	デキサート 16.5mg	div(15分)	day1,2,8,15,22
	生理食塩水 50mL		
Rp.3	カイプロリス 56mg/m ² (day1,2のみ20mg/m ²)	div(30分)	day1,2,8,9,15,16
	注射用水(10mgあたり5mLで溶解) 5%ブドウ糖液 49mL		
Rp.4	生食 50mL	div(15分)	day1,2,8,15,22
Rp.5	ダラザレックス 16mg/kg (day1,2のみ8mg/kg)	div ^{※2}	day1,2,8,15,22
	生理食塩水 ^{※1}		
Rp.6	レナデックス錠 20mg/body	分1 p.o.(朝食後)	day 8,16,23

【2コース】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	ボララミン 5mg	div(15分)	day1,8,15,22
	アゼリオ 500mg		
Rp.2	デキサート 16.5mg	div(15分)	day1,8,15,22
	生理食塩水 50mL		
Rp.3	カイプロリス 56mg/m ²	div(30分)	day1,2,8,9,15,16
	注射用水(10mgあたり5mLで溶解) 5%ブドウ糖液 49mL		
Rp.4	生食 50mL	div(15分)	day1,8,15,22
Rp.5	ダラザレックス 16mg/kg	div ^{※2}	day1,8,15,22
	生理食塩水 ^{※1}		
Rp.6	レナデックス錠 20mg/body	分1 p.o.(朝食後)	day2,8,16,23

【3~6コース】

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)											
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	28
デキサート	16.5mg/body/day	div	○			○					○			○
ダラザレックス	16mg/kg	div	○			○					○			○
カイプロリス	56mg/m ²	div	○	○		○	○				○	○		○
レナデックス錠	20mg/body/day	p.o.					○						○	○

【7コース以降】

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)											
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	28
デキサート	16.5mg/body/day	div	○			○					○			○
ダラザレックス	16mg/kg	div	○			○					○			○
カイプロリス	56mg/m ²	div	○	○		○	○				○	○		○
レナデックス錠	20mg/body/day	p.o.					○						○	○

【3-6コース】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	ボララミン 5mg	div(15分)	day1,15
	アゼリオ 500mg		
Rp.2	デキサート 16.5mg	div(15分)	day1,8,15
	生理食塩水 50mL		
Rp.3	カイプロリス 56mg/m ²	div(30分)	day1,2,8,9,15,16
	注射用水(10mgあたり5mLで溶解) 5%ブドウ糖液 49mL		
Rp.4	生食 50mL	div(15分)	day1,15
Rp.5	ダラザレックス 16mg/kg	div ^{※2}	day1,15
	生理食塩水 ^{※1}		
Rp.6	レナデックス錠 20mg/body	分1 p.o.(朝食後)	day2,8,16,22,23

【7コース以降】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	ボララミン 5mg	div(15分)	day1
	アゼリオ 500mg		
Rp.2	デキサート 16.5mg	div(15分)	day1,8,15
	生理食塩水 50mL		
Rp.3	カイプロリス 56mg/m ²	div(30分)	day1,2,8,9,15,16
	注射用水(10mgあたり5mLで溶解) 5%ブドウ糖液 49mL		
Rp.4	生食 50mL	div(15分)	day1
Rp.5	ダラザレックス 16mg/kg	div ^{※2}	day1
	生理食塩水 ^{※1}		
Rp.6	レナデックス錠 20mg/body	分1 p.o.(朝食後)	day2,8,16,22,23

【参考文献:Lancet2020;398:186-197】

【備考1:ダラザレックスは0.2ミクロン以下のインラインフィルターを通して投与すること。また、輸注ポンプを用いて投与すること。】

【備考2:デキサメタゾン、抗ヒスタミン剤及びアセトアミノフェン500mgの前投薬(ダラザレックス投与の1時間前)を行う。また、モンテルカスト錠10mgの前投薬(ダラザレックス投与の1時間前)は初回は行うが、その後は適宜必要時投与。】

【備考※1:総量500mLになるよう調整する。】

【備考※2:投与速度は添付文書参照。】

【変法情報:75歳以上もしくは患者の状態によって、1コース目2週目以降のデキサメタゾンを20mg/週とする。】

【変法情報:デキサート注は、デキサメタゾンリン酸エステルとして20mg。】