

【 診療科:血液腫瘍内科 】
 【 レジメン登録番号:IG-117 】

〈 Pralatrexate療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)								
			1	...	8	15	22	29	36	...	49
ジフォルタ	30mg/m ²	div	○		○	○	○	○	○		

【1コース期間: 49日】

【総コース数:制限無し】

【適応癌種:再発・又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
薬剤投与基準量			

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	ジフォルタ 30mg/m ²	div(全開で、5分以内)	day1, 8, 15, 22, 29, 36
	生理食塩液 50mL		

【参考文献:ジフォルタ注射液添付文書、JCA.Cancer Sci 108 (2017)2061-2068、J Clin Oncol 29:1182-1189.】

【備考: 本剤初回投与日の10日以上前から、葉酸として1日1回1.0~1.25mgを連日経口投与する。本剤の投与終了日から30日間は投与を継続する。】

【備考: 本剤初回投与日の10日以上前から、ビタミンB12として1回1mgを8~10週ごとに筋肉内投与する。本剤投与中は、投与を継続する。】

【備考: 口内炎等の副作用発現軽減目的として、ホリナートの経口投与を考慮する。その場合、葉酸・ビタミンB12の投与を本剤初回投与日の7日以上前とすることができる。】