【 診療科：血液内科 】
【 レジメン登録番号：IG-30 】

# 〈 R-CHOP療法 〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール（day） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ・・・・・ | 15 | ・・・・ | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リツキシマブBS | 375mg/㎡ | div | ○ | | | | | | | | |
| アドリアシン | 50mg/㎡ | div | | ○ | | | | | | | |
| エンドキサン | 750mg/㎡ | div | | ○ | | | | | | | |
| オンコビン | 1.4mg/㎡（max2mg/body） | div | | ○ | | | | | | | |
| プレドニン | 100mg/body | p.o. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |

【1コース期間：21日】　　【総コース数：6～8コース】

【適応癌種：CD20陽性　B細胞型　中高悪性度非ホジキンリンパ腫 】

【時期：　術前　、　術後　、　手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## 投与プロトコール

＜day1＞

| Rp | 薬剤名 | 投与経路（速度） |
|---|---|---|
| Rp.1 | ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ(100)　1V | div（全開で） |
| | 生理食塩液　50mL | |
| Rp.2 | リツキシマブBS　375mg/㎡ | div（添付文書参考に） |
| | 生理食塩液　500mLで10倍希釈 | |

＜day2＞

| Rp | 薬剤名 | 投与経路（速度） |
|---|---|---|
| Rp.1 | 5-$HT_3$RB 1A | div(全開で) |
| | 生理食塩液　50mL | |
| Rp.2 | ｵﾝｺﾋﾞﾝ　1.4mg/㎡ | div（全開で） |
| | 生理食塩液　50mL | |
| Rp.3 | ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ　50mg/㎡ | div（30分かけて） |
| | 5%Glu 100mL | |
| Rp.4 | ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ　750mg/㎡ | div（2時間かけて） |
| | 生理食塩液　500mL | |
| Rp.5 | 生理食塩液　50mL | div(全開で) |

【参考文献：　　】
【備考：リツキシマブBS投与の30分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤等の前投与を行うこと。
　また、副腎皮質ホルモン剤と併用しない場合は、副腎皮質ホルモン剤の前投与を考慮するこ

【変法情報①：腫瘍崩壊症候群の防止のために、初回はリツキシマブBS抜きのCHOP療法となることがある。 】

【変法情報②：day2をday1やday3に振り替えて投与することがある。】