

【 診療科:血液腫瘍内科】
 【 レジメン登録番号:IG-49 】

〈 DeVIC 療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	21			
イホマイド	1,500mg/m ²	div	○	○	○												
カルボプラチン	300mg/m ²	div	○														
エトポシド	100mg/m ²	div	○	○	○												
ウロミテキサン	300mg/m ² × 3	div	○	○	○												
デキサート	40mg/body	div	○	○	○												

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 3~5 コース】

【適応癌種:悪性リンパ腫】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
好中球数	1,000未満		
血小板数	70,000未満		
クレアチニン	2.0以上		

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ R blocker 1A	div(全開で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	デキサート 19.8mg	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	イホマイド ² 1,500mg/m ²	div(3時間で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.4	ウロミテキサン 300mg/m ² ※	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.5	エトポシド 100mg/m ²	div(3時間で)
	5%ブドウ糖液 500mL	
Rp.6	ウロミテキサン 300mg/m ² ※	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.7	カルボプラチン 300mg/m ²	div(3時間で)
	5%ブドウ糖液 500mL	
Rp.8	ウロミテキサン 300mg/m ² ※	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.9	デキサート 19.8mg	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL	

<day2~3>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ R blocker 1A	div(全開で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	デキサート 19.8mg	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	イホマイド ² 1,500mg/m ²	div(3時間で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.4	ウロミテキサン 300mg/m ² ※	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.5	エトポシド 100mg/m ²	div(3時間で)
	5%ブドウ糖液 500mL	
Rp.6	ウロミテキサン 300mg/m ² ※	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.7	ウロミテキサン 300mg/m ² ※	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.8	デキサート 19.8mg	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL	

【参考文献:臨床血液 1994;35:635-641

【備考:※…ウロミテキサンは、イホマイド開始時、4時間後、8時間後から投与

【変法情報:70歳以上は70%に減量して投与

】
 】
 】