【 診療科：血液内科 】
【 レジメン登録番号：IG-71】

〈 GDP療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール（day）
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 ・・・・・ 15 ・・・・ 21
ジェムザール	1000mg/㎡	div	○ ○
シスプラチン	75mg/㎡	div	○
デキサート	33mg/body	div	○ ○ ○ ○

【1コース期間：21日】　　【総コース数：3コース】

【適応癌種：悪性リンパ腫（再発・難治性） 】

【時期： 術前 、 術後 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	5-HT_3R Blocker 1A	div（全開で）
	生食 100mL	
Rp.2	ﾃﾞｷｻｰﾄ 16.5mg/body	div（1時間で）
	生食 100mL	
Rp.3	ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ 1000mg/㎡	div（30分かけて）
	生食 250mL	
Rp.4	生食 250mL	div（30分かけて）
Rp.5-①	ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS 300mL	div（Rp.5-②と同時投与、2時間かけて）
Rp.5-②	シスプラチン 75mg/㎡	div（Rp.5-①と同時投与、2時間かけて）
	生食 500mL※1	
Rp.6	生食 500mL	div（2時間かけて）
Rp.7	ﾃﾞｷｻｰﾄ 16.5mg/body	div（1時間で）
	生食 100mL	

<day2～4>

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	ﾃﾞｷｻｰﾄ 16.5mg/body	div（1時間で）
	生食 100mL	
Rp.2	ﾃﾞｷｻｰﾄ 16.5mg/body	div（1時間で）
	生食 100mL	

<day8>

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	5-HT_3R Blocker 1A	div（全開で）
	生食 100mL	
Rp.2	ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ 1000mg/㎡	div（30分かけて）
	生食 250mL	

【参考文献：J Clin Oncol.2014;32:3490-6 】
【備考：・基本はCV挿入にて実施。
・メインルートの輸液量は患者の状態に合わせて別途指示。
※1・・・生理食塩水の量はシスプラチンと合わせて500mLとなるようにする。】
【変法情報：B細胞型、CD20+の場合はリツキシマブ併用を考慮する。 】
【変法情報※：デキサート注は、デキサメタゾンリン酸エステルとして40mg。 】