

〈 E-Ld療法 〉

〈1～2コース〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----------------|---|-----|---|---|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|--|--|
| | | | 1 | 2 | ... | 8 | 9 | ... | 15 | 16 | ... | 21 | 22 | 23 | ... | 28 | | |
| レナデックス | 28mg/body | p.o. | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | | ○ | | |
| デキサート | 6.6mg | div | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | | ○ | | |
| エムプリシティ | 10mg/kg | div | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | | ○ | | |
| レブラミド | 25mg/body | p.o. | ← Day1～21まで内服 → | | | | | | | | | | | | | | | |

〈3コース以降〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----------------|---|-----|---|---|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|---|--|
| | | | 1 | 2 | ... | 8 | 9 | ... | 15 | 16 | ... | 21 | 22 | 23 | ... | 28 | | |
| レナデックス | 28mg/body | p.o. | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40mg/body | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | |
| デキサート | 6.6mg | div | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| エムプリシティ | 10mg/Kg | div | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| レブラミド | 25mg/body | p.o. | ← Day1～21まで内服 → | | | | | | | | | | | | | | | |

【1コース期間:28日間】 【総コース数: 】

【適応癌種:多発性骨髄腫】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|---------|----|------|----------|
| 薬剤投与基準量 | | | |

投与プロトコール

〈1～2コース〉

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) | 投与日 |
|------|--------------------|----------------|-----------------|
| Rp.1 | レナデックス 28mg/body | p.o.(分1) | day1, 8, 15, 22 |
| Rp.2 | デキサート 6.6mg | div(15分間で) | day1, 8, 15, 22 |
| | 生理食塩水 50mL | | |
| Rp.3 | ポララミン注1A | div(15分間で) | day1, 8, 15, 22 |
| | ガスター注1A | | |
| | 生食 50mL | | |
| Rp.4 | 生食 100mL | div(30分間で) | day1, 8, 15, 22 |
| Rp.5 | エムプリシティ10mg/kg | div(添付文書参考(に)) | day1, 8, 15, 22 |
| | 注射用水 ^{※1} | | |
| | 生食 250mL | | |
| Rp.6 | レブラミド 25mg/body | p.o.(分1) | day1～21 |

〈3コース以降〉

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) | 投与日 |
|------|--------------------|----------------|----------|
| Rp.1 | レナデックス 28mg/body | p.o.(分1) | day1, 15 |
| | レナデックス 40mg/body | | day8, 22 |
| Rp.2 | デキサート 6.6mg | div(15分間で) | day1, 15 |
| | 生理食塩水 50mL | | |
| Rp.3 | ポララミン注1A | div(15分間で) | day1, 15 |
| | ガスター注1A | | |
| | 生食 50mL | | |
| Rp.4 | 生食 100mL | div(30分間で) | day1, 15 |
| Rp.5 | エムプリシティ10mg/kg | div(添付文書参考(に)) | day1, 15 |
| | 注射用水 ^{※1} | | |
| | 生食 250mL | | |
| Rp.6 | レブラミド 25mg/body | p.o.(分1) | day1～21 |

【参考文献:N Engl J Med 2015;373:621-31, エムプリシティ点滴静注用添付文書】

【備考※1:エムプリシティの300mg製剤は注射用水13mL、400mg製剤は注射用水17mLで溶解。】

【備考2:エムプリシティは0.22ミクロン以下のインラインフィルターを通して投与する。】

【備考3:レナデックスは、エムプリシティ投与3～24時間前に内服する。】

【備考4:前投薬について】

デキサート:エムプリシティ投与の45分前までに投与を終了する。

ポララミン・ガスター:エムプリシティ投与の30分前までに投与を終了する。(ガスターは医師の判断で投与しない場合がある。)

アセトアミノフェン:エムプリシティ投与30～90分前までに投与する。】

【変法情報:】