

【 診療科:血液内科 】
 【 レジメン登録番号:IG-93 】

〈 BG (Obinutuzumab + Bendamustine) 療法 〉

【1コース】

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)								
			1	2	8	15	28	
トレアキシリン	90mg/m ²	div	○	○							
ガザイバ	1000mg/body	div	○			○			○		

【2～6コース】

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)							
			1	2	28		
トレアキシリン	90mg/m ²	div	○	○						
ガザイバ	1000mg/body	div	○							

【1コース期間:28日】 【総コース数: 6 】

【適応癌種:悪性リンパ腫(CD20+ 濾胞性リンパ腫)】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

【第1日目】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ RB 生理食塩液 50mL	div(全開で)
Rp.2	トレアキシリン 90mg/m ² 生理食塩液 250mL	div(1時間かけて)
Rp.3	デキサート 9.9mg 生理食塩液 50mL	div(30分かけて)
Rp.4	生理食塩液 50mL	div(30分かけて)
Rp.5	アセトアミノフェン 400mg ポラミン 4mg	p.o. ^{※1}
Rp.6	ガザイバ 1000mg/body 生理食塩液 199mL	div(添付文書参考に)
Rp.7	生理食塩液 50mL	div(全開)

【第2日目】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ RB 生理食塩液 50mL	div(全開で)
Rp.2	トレアキシリン 90mg/m ² 生理食塩液 250mL	div(1時間かけて)
Rp.3	生理食塩液 50mL	div(全開)

【第8、15日目(1コース目のみ)】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 9.9mg 生理食塩液 50mL	div(30分かけて)
Rp.2	生理食塩液 50mL	div(30分かけて)
Rp.3	アセトアミノフェン 400mg ポラミン 4mg	p.o. ^{※1}
Rp.4	ガザイバ 1000mg/body 生理食塩液 199mL	div(添付文書参考に)
Rp.5	生理食塩液 50mL	div(全開)

【参考文献:N Engl Med 2017;377:1331-44】

【備考:6コース投与終了後、ガザイバ単独療法を2ヶ月毎に2年間投与する。】

【備考:※1 ガザイバ投与の30分～60分前に投与を行うこと。】

【備考:インラインフィルター(0.2又は0.22 μm)を用いて投与すること。】

【備考:ガザイバの前投薬のデキサートは適宜減量・中止する場合あり。】

【変法情報:

】
)
)
)
)
)